



Λαχνοοζώδης υμενίτιδα PVNS (Pigmented Villonodular Synovitis)

Η λαχνοοζώδης υμενίτιδα είναι μια καλοήθης (μη καρκινική) πάθηση που επηρεάζει το εσωτερικό τοίχωμα (υμένα) της άρθρωσης. Η αιτία της είναι άγνωστη, μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε άρθρωση, αλλά εμφανίζεται συχνότερα στο γόνατο.

Μπορεί επίσης να επηρεάσει και μαλακά μέρη, όπως τενόντων ή των θυλάκων. Όταν αναπτύσσεται σε ισχίο, ο υμένας της άρθρωσης παρουσιάζει φλεγμονή προκαλώντας κακό βιολογικό περιβάλλον με συνέπεια βλάβη στην άρθρωση και αρθρίτιδα.

Ακόμα σε φάση έξαρσης , μπορεί να επηρεάσει την κίνηση και τη λειτουργία της άρθρωσης. Στο ισχίο είναι πιο συχνό στις γυναίκες και γενικά εμφανίζεται μεταξύ 30 με 50 ετών .

Σημάδια και συμπτώματα

- Πόνος
- Μειωμένο εύρος κίνησης

Μη χειρουργική θεραπεία

- Η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε συμπληρωματικά της χειρουργικής επέμβασης για τη μείωση του κινδύνου υποτροπής, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις υποτροπής.
- Οι ενέσεις φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της ακτινοθεραπείας με έγχυση, έχουν αποδειχθεί χρήσιμες για ορισμένους ασθενείς, συνοδεύονται από παρενέργειες.



Χειρουργική Θεραπεία

Όταν οι αρθρικές επιφάνειες των αρθρώσεων παραμένουν ανεπηρέαστες ή σε καλή κατάσταση, η υμενεκτομή είναι η θεραπεία εκλογής. Αυτή περιλαμβάνει την αφαίρεση είτε μέρους είτε ολόκληρου του υμένα της άρθρωσης. Η υμενεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί αρθροσκοπικά ή μέσω ανοιχτής επέμβασης. Αντίθετα, εάν υπάρχει σημαντική φθορά της άρθρωσης, η ολική αρθροπλαστική ισχίου μπορεί να είναι η μόνη θεραπεία που είναι πιθανό να ανακουφίσει τα συμπτώματα.

Ακόμα και με χειρουργική επέμβαση, η PVNS μπορεί να υποτροπιάσει και να απαιτήσει πρόσθετες θεραπείες, όπως επαναλαμβανόμενη χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία.